

下部消化器癌レジメン

レジメン名	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与日	1サイクルの日数
mFOLFOX6 ±分子標的薬	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1	
	*分子標的薬 ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	
	セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8	
SOX ±Bevacizumab	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日
	S-1	80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	
	(ペバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
CapeOx(XELOX) ±Bevacizumab	オキサリプラチン	130mg/kg	点滴静注	day1	21日
	カペシタピン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	
	(ペバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
FOLFIRI ±分子標的薬	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14日
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1	
	*分子標的薬 ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	
	セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8	
IRIS ±Bevacizumab	イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,15	28日
	S-1	80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	
	(ペバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	day1,15	
FOLFOXIRI ±Bevacizumab	イリノテカン	165mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	フルオロウラシル	3200mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1	
	(ペバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	day1	
UFT/LV ±Bevacizumab	UFT	300mg/m <sup>2</sup> /day	1日3回内服	day1-21	28日
	ホリナートカルシウム	75mg/body/day	1日3回内服	day1-21	
	(ペバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	day1,15	
Capecitabine+Bevacizumab	カペシタピン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	21日
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
Trifluridine/tipiracil+Bevacizumab	トリフルリジン/チピラシル	70mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1-5,day8-12	28日
	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1,15	
CPT-11 ±分子標的薬	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14日
	*分子標的薬 セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8	
	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	
Cetuximab	セツキシマブ	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	7日
Panitumumab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	14日