

フルミスト(経鼻弱毒生インフルエンザワクチン)について

小児科外来にて経鼻インフルエンザワクチンの取り扱いを開始します。

こちらは鼻に噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。

そのため、針を刺す必要がありません。

下記の概要・注意点をご確認いただき、ご検討下さい。

予約に関しては、【インフルエンザワクチンについてのお知らせ】をご覧ください。

概要

接種対象	2歳～15歳
接種回数	1回
接種方法	左右の鼻腔に 0.1cc ずつ噴霧
価格	8,800 円
副反応	鼻汁・鼻閉・喘鳴・頭痛・嘔吐・筋肉痛・発熱・咽頭痛などがみられることがあります。
	稀にアナフィラキシーショックが起こる場合もあります。 ※接種後 30 分以内に起こることが多い。

注意点

フルミストを接種出来ない方	
✓	ゼラチンアレルギーや、重度の鶏卵アレルギーをお持ちの方
✓	気管支喘息の既往がある方(1年以内に重い喘息症状があった等、重度の喘息発作がある方) ※1
✓	免疫低下(抗がん剤治療・授乳婦・妊婦・妊娠の可能性のある女性等)の人と接触がある方 ※2

※1 他院で気管支喘息の継続治療を受けている方は、主治医にご確認下さい。

5歳未満で喘息治療中の方も、接種が推奨されていません。

※2 生ワクチンのため、飛沫又は接触によりワクチンウイルスが水平伝播の可能性があります。

1～2週間は接触を控えてください。

上記項目に当てはまる場合は、接種することができません。注射ワクチンをご予約下さい。

診察時に医師が接種不可と判断した場合は、注射ワクチンでの対応となります。

接種時に鼻汁・鼻閉の症状を認めている場合は、接種できない場合があります。

泣いてしまう等、拒否が強い場合は十分な効果が得られないことがあります。

心配な点・不明点等があれば、受診時に医師へご相談ください。