

**** 吸入薬の使い方 ****

吸入薬の説明：

() インターール吸入液 (1 アンプル 2cc を使用します)

- ① 気道粘膜に対する抗アレルギー作用を持つ基剤です。
- ② ベネトリン吸入液と混ぜて使用します。

() ベネトリン吸入液 (1 回 0.3cc を、注射器で計って使用します)

- ① 気管支を広げて呼吸を楽にする薬です。
- ② インターール吸入液と混ぜて吸入します。
- ③ 一日に 4 回まで吸入できます。
- ④ 症状が改善したら、吸入回数を減らしても可いです。
- ⑤ 誤って大量に飲むと危険です。子供の手の届かないように管理して下さい。

() パルミコート吸入液 (1 アンプル 2cc を使用します)

- ① 気管支喘息などの、気道過敏性を鎮める吸入薬です。
- ② 一日 1 回吸入します。
- ③ 症状が良くなっても、医師の指示通り継続して下さい。

() ボスミン吸入 (1 回 3cc を、注射器で計って使用します)

- ① クループ症状や、急性細気管支炎に対する吸入薬です。
- ② 声門や、細気管支の炎症による腫れを軽減します。
- ③ 一日 3 回吸入します。
- ④ 症状が改善したら、吸入回数を減らしても可いです。
- ⑤ 誤って大量に飲むと危険です。子供の手の届かないように管理して下さい。

保証金のこと：

- ①保証金をお預かりするのは、「大切に使用しましょう」という、お互いの意思の確認のためです。
- ②貸し出し吸入器は消耗品ですので、大切に取り扱いながらも破損する場合があります。
そういう場合、保証金はお返しできます。
- ③不適切な取り扱い、不注意による破損の無いように注意して下さい。